



My BREAST CANCER *Doc*

Jean-Claude Schwartz M.D., Ph.D.

631 Professional Drive, Suite 300 Lawrenceville, Georgia 30046 tel:770-962-9977 fax:770-339-9804

www.mybreastcancerdoc.com

CUIDADO DE SU DRENAJE JP

El Drenaje JP elimina el liquido de alrededor de la incision. Esto ayuda a prevenir infecciones. Debe vaciar el drenaje 3 veces al dia y registrar la informacion en la hoja de registro de drenaje. Pelar el tubo de drenaje disminuye la incidencia de coagulos de sangre en el tubo.

LO QUE NECESITARAS:

Guantes desechables (opcional)

Taza medidora

Hoja de registro de drenaje

Vacia la Bombilla:

- Ponerte guantes desechables, si necesario.
- Apunte la parte superior de la bombilla lejos de usted y quite el tapon.
- Voltee la bombilla boca abajo sobre una taza medidora. Exprima el liquido en la taza, Asegurese de que la bombilla este totalmente vacia.
- Registre la cantidad de liquido en la taza. Luego vacie la taza como se indica. Vacie 3 veces al dia.
- Limpie la parte superior de la bombilla con una toallita con alcohol si es necesario.
- Apriete bien el bulbo para dejar salir todo el aire. Mantenga la bombilla apretada y vuelva a colocar el tapon en la parte superior.

Llame a su medico si nota alguno de estos cambios:

- La cantidad de liquido aumenta o disminuye repentinamente.
- El color, olor o espesor del liquido cambia.
- El tubo se cae o la incision se abre.
- La piel alrededor del drenaje esta roja, hinchada, duele o supura pus.
- Tiene fiebre de 101 grados o mas.

YouTube:

CARE OF YOUR JACKSON PRATT DRAIN

<https://www.youtube.com/watch?v=xDv1D2c8eLY>



